



The World Professional Association for Transgender Health (WPATH)

2009 XXI Biennial Symposium

Childhood – Adulthood

Culture and Brain

June 17–20, 2009



Local Organizers: Harry Benjamin Resource Center (HBRS)



Aspetti psicologici delle persone trans

Chiara Dalle Luche

Psicoterapia e transessualismo

Massimo Lavaggi

Problematiche di genere in età evolutiva

Barbara Santoni

27/11/2009 – III° congresso nazionale Associazione Trans Genere (www.transgenere.it)

Aspetti psicologici delle persone trans

Dott.ssa Chiara Dalle Luche – Psicologa
Associazione Trans Genere – Consultorio Transgenere
chiara.dalleluche@transgenere.it

Psychological Aspects of Transgender People (Gender Dysphoria) in Spain
Gender Identity Disorder and SWAP-200. A Research on GID Personality Styles
Revision Suggestions for Gender Related Diagnoses in the DSM and ICD

WPATH XXI Biennial Symposium, Oslo 2009

Psychological Aspects of Transgender People (Gender Dysphoria) in Spain

21/11/2009 – III° Congresso Nazionale Associazione Trans Genere (www.transgenere.it)
Jose Miguel Rodriguez-Molina, Clinical Psychologist, PhD; Nuria Asenjo, Clinical Psychologist; Antonio Becerra, MD, Ph. D.; María Jesús Lucio, Sociologist.
The Gender Identity Disorder Unit of Ramón y Cajal

Questa ricerca vuole descrivere alcuni aspetti psicologici di persone transgender:
personalità, tratti psicopatologici, depressione, stress, competenza emotiva, qualità della vita e benessere

Risultati.

Non appaiono differenze significative tra persone transessuali e popolazione generale in **depressione, psicopatologia e competenza emotiva.**

Ci sono differenze significative in **stress, qualità della vita e benessere.**

Conclusioni.

Le differenze sembrano esistere tra popolazione generale e persone transessuali in alcune variabili psicologiche ma non in altre.

Quindi non esiste nessuno profilo psicologico definito di persona transgender.

Gender Identity Disorder and SWAP-200. A Research on GID Personality Styles

Valerio, Paolo, Professor; Nunziante, Cesaro Adele, Professor ;
Delli Veneri Alessandra PhD; Orlando Eva, PhD

Lo scopo di questa ricerca è quello di **analizzare la diagnosi GID in una prospettiva più ampia**, considerando la personalità nel suo complesso e non solo in relazione ai suoi disturbi, per mezzo di Swap-200 (Shedler, Westen, 1998) con soggetti transessuali.

21/11/2009 – III° congresso formativo Associazione TransGenere (www.transgenere.it)

Gender Identity Disorder and SWAP-200. A Research on GID Personality Styles

Valerio, Paolo, Professor; Nunziante, Cesaro Adele, Professor ;
Delli Veneri Alessandra PhD; Orlando Eva, PhD

Questo studio non è uno strumento
per trovare lo stile di
"personalità transessuale",
ma vuole **analizzare diversi stili di personalità**
individuati nel nostro campione, insieme a
una valutazione della **comorbidità con**
eventuali disturbi di personalità.

Metodo.

5 colloqui clinici necessari per costruire il **layout della personalità attraverso Swap-200**, una procedura di valutazione della personalità.

Campione.

Lo studio è effettuato su **12 soggetti (6 FTM e 6 MTF)** selezionati mediante campionamento a palle di neve.

I soggetti hanno una diagnosi di **Disturbo dell'Identità di Genere**, anche se non tutti si sono sottoposti ad intervento chirurgico di riattribuzione sessuale.

Risultati.

Non si rilevano correlazioni tra il GID e disturbi di personalità in Asse II del DSM-IV-TR. Inoltre, i soggetti mostrano punteggi elevati nelle scale di funzionamento, dimostrando un buon livello di adattamento sociale ed espressione delle loro potenzialità.

Conclusioni.

I soggetti transessuali sono stati spesso etichettati come personalità patologiche, spesso accostati al disturbo borderline. I risultati mostrano che queste correlazioni non esistono.

I risultati di questa ricerca auspicano una ridefinizione della condizione di transessualismo volta a superare gli stereotipi negativi legati ai concetti di “esclusivamente maschile” ed “esclusivamente femminile”.

Revision Suggestions for Gender Related Diagnoses in the DSM and ICD

Randall D. Ehrbar, PsyD, Kelly Winters, PhD, Nicholas R. Gorton, MD

A partire da differenti ipotesi sull'appropriatezza della diagnosi di GID, i membri di questo gruppo di ricerca sono giunti a conclusioni simili riguardo a **cambiamenti auspicabili per questa categoria diagnostica nelle prossime versioni di DSM e ICD.**

Secondo questi ricercatori, le diagnosi di DIG, transessualismo e DIG in età evolutiva dovrebbero:

1. essere centrate sul concetto di **Disforia di Genere**, il disagio causato dai caratteri sessuali del corpo e/o dai ruoli di genere;
2. allargarsi per comprendere le persone che **non si riconoscono in una visione “binaria” del genere**, e che non richiedono una transizione totale verso il genere opposto;
3. essere riferite solo alle persone che **sperimentano la disforia di genere**, e quindi hanno presumibilmente **bisogno di supporto medico e psicologico**.